



www.fisherspediatric.com
317.598.9898

Instrucciones para el cuidado postoperatorio de las Extracciones

Asegúrese que su niño/a continúe a morder la gasa/el algodón hasta que el área de la extracción deje de sangrar. (Ésto puede tomar hasta 30 minutos.)

No use sorbetos/popotes/(tubitos largos de plástico para tomar líquidos), botellas, tazas entrenadora o tazas con popotes, chupones/chupetes durante las primeras 24 horas. (La acción de chupar puede causar el sangrado.)

Evite que su niño/a coma alimentos picantes, ácidos o crujientes durante las primeras 24 horas. Éstos pueden irritar el área de la extracción.

Deje que su niño/a se cepille los dientes el mismo día de la extracción para mantener el área limpia y libre de bacterias.

Los medicamentos *Tylenol*, *Motrin* o *Advil* pueden disminuir cualquier malestar.



www.fisherspediatric.com
317.598.9898

Instrucciones para el cuidado postoperatorio de las Extracciones

Asegúrese que su niño/a continúe a morder la gasa/el algodón hasta que el área de la extracción deje de sangrar. (Ésto puede tomar hasta 30 minutos.)

No use sorbetos/popotes/(tubitos largos de plástico para tomar líquidos), botellas, tazas entrenadora o tazas con popotes, chupones/chupetes durante las primeras 24 horas. (La acción de chupar puede causar el sangrado.)

Evite que su niño/a coma alimentos picantes, ácidos o crujientes durante las primeras 24 horas. Éstos pueden irritar el área de la extracción.

Deje que su niño/a se cepille los dientes el mismo día de la extracción para mantener el área limpia y libre de bacterias.

Los medicamentos *Tylenol*, *Motrin* o *Advil* pueden disminuir cualquier malestar.