



www.fisherspediatric.com

317.598.9898

Instrucciones para el cuidado postoperatorio del Adormecimiento

El adormecimiento puede durar aproximadamente de 1 a 3 horas.

No debe comer nada que requiera masticar hasta que al adormecimiento pase.

Los medicamentos *Tylenol*, *Motrin* o *Advil* pueden disminuir el malestar a medida que pase el adormecimiento.

Su niño/a puede tomar algo inmediatamente. También puede comer alimentos que no requieren masticar como helado, pudín, gelatina, papas majadas/pure de papas, etc.

Vigile que su niño/a no se muerda la lengua, las mejillas o los labios. No se dará cuenta cuán duro está mordiendo y puede lastimarse.



www.fisherspediatric.com

317.598.9898

Instrucciones para el cuidado postoperatorio del Adormecimiento

El adormecimiento puede durar aproximadamente de 1 a 3 horas.

No debe comer nada que requiera masticar hasta que al adormecimiento pase.

Los medicamentos *Tylenol*, *Motrin* o *Advil* pueden disminuir el malestar a medida que pase el adormecimiento.

Su niño/a puede tomar algo inmediatamente. También puede comer alimentos que no requieren masticar como helado, pudín, gelatina, papas majadas/pure de papas, etc.

Vigile que su niño/a no se muerda la lengua, las mejillas o los labios. No se dará cuenta cuán duro está mordiendo y puede lastimarse.